

ÉVALUATION DE L'INTENSITÉ DU PRURIT CHEZ LE PATIENT DIALYSÉ



	Nom du pa	itient:		
Cette é	E WI-NRS* chelle permet au pa vires démangeaisons	tient d'auto-évaluer rap s sur 24h ^{1,2,3} :	idement le degré	é d'intensité
Quelle a		otre pire démangeaison uillez ne cocher qu'une seule répo		nières 24h ?
0	1 2 3	4 5 6	7 8	9 10
Aucune émangeaison	Légère	Modérée	Sévère	Pire démangeaisoi

^{*}Traduction française de l'échelle WI-NRS « Worst Itching Intensity Numerical Rating Scale » (échelle d'évaluation numérique de l'intensité des pires démangeaisons). 1,2,3

^{1.} Marthur et al. A Longitudinal Study of Uremic Pruritus in Hemodialysis Patients. Clin J Am Soc Nephrol. 2010 Aug; 5(8): 1410-1419.

^{2.} Phan et al. Assessment of Pruritus Intensity: Prospective Study on Validity and Reliability of the Visual Analogue Scale, Numerical Rating Scale and Verbal Rating Scale in 471 Patients with Chronic Pruritus. Acta Derm Venereol 2012; 92: 502-507.

^{3.} Reich et al. Visual Analogue Scale: Evaluation of the Instrument for the Assessment of Pruritus. Acta Derm Venereol 2012; 92: 497-501.